


Рак Печени



Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) — разновидность рака, которая занимает четвертое место в мире среди всех причин смерти, связанных с онкологией. ГЦК до поры до времени может не давать о себе знать, а обнаружена будет в тот момент, когда делать что-либо уже поздно. Значит, роль профилактики и ранней диагностики в терапии рака печени чрезвычайно высока.

Гепатит В

Гепатит С

Цирроз

ВИЧ инфекция

Алкогольная зависимость

Метаболический синдром, ожирение и сахарный диабет

ГРУППЫ РИСКА

Неалкогольная жировая болезнь печени

Токсические повреждения печени (например, отравление афлатоксинами или аристокхолиевой кислотой, действие винилхлорида, стероидных гормонов)

Возможные симптомы ГЦК:



Снижение массы тела



Пожелтение кожи и склер (белков) глаз



Дискомфорт и ощущение тяжести в правом подреберье



Отсутствие аппетита



Обесцвечивание стула



Появление боли в правом подреберье и в животе



Слабость



Вздутие живота



Появление отеков (асцита) и увеличение размеров живота



Однако, примерно у 25 % пациентов ГЦК развивается при полном отсутствии симптомов и сопутствующих патологий. Своевременное прохождение обследования и обнаружение заболевания на ранней стадии является залогом успешного лечения.

Существует несколько подходов к диагностированию ГЦК:

ЗА РУКУ

Развернутый биохимический анализ крови (с измерением уровня альбумина, общего и прямого билирубина, определением протромбинового времени и подсчетом кол-ва тромбоцитов)

Определение уровня альфа-фетопротеина (АФП)



УЗИ брюшной и забрюшинной полости (с контрастированием)



За дополнительной консультацией обратитесь к:

- Онкологу
- Гастроэнтерологу
- Гепатологу
- Инфекционисту



Запишитесь на бесплатное обследование (анализ АФП и УЗИ)* и получите дополнительную информацию на www.liverlive.ru

*Доступно для жителей г. Москва и г. Санкт-Петербург

Профилактика ГЦК



1. Сведение к минимуму риска цирроза - избавиться от лишнего веса и ограничить употребление алкоголя.



2. Прививка от гепатита В. Устранение стресс-факторов заражения гепатитом С, от которого пока не существует вакцины - не заниматься незащищенным сексом, не употреблять наркотики (тем более через внутривенные инъекции), делать татуировки только в проверенных местах с лицензией и, само собой, проверяться после поездок в неблагополучные с точки зрения вирусных гепатитов регионы.



3. Проходить регулярную диагностику, диспансеризацию. Для пациентов из группы риска необходимо проходить диагностику раз в 6 месяцев.



Узнайте больше о раке печени и онконастороженности, а также о поддержке родных и близких на нашем сайте zaruku.com

НИЧТО В ДАННЫХ МАТЕРИАЛАХ НЕ ДОЛЖНО ВОСПРИНИМАТЬСЯ КАК ЗАМЕНА КОНСУЛЬТАЦИИ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА

№ M-RU-00000787 Сентябрь 2020

Roche